


Rastlinný liek na zmiernenie bolesti svalov
Capsagamma®
 53 mg/100 g krém



Kapsaicín pôsobí ako selektívny agonista TRPV receptorov, ktoré sa nachádzajú v nociceptoroch (receptory vnímania bolesti) kože.

Pôsobí v dvoch etapách:

1. etapa:

po lokálnom použití vyvoláva podráždenie v mieste aplikácie, ktoré sa prejavuje symptomaticky ako erytém a pálenie, niekedy aj svrbenie, čo je podmienené uvoľňovaním neurotransmitera – substancie P.


2. etapa:

pri opakovanom podávaní kapsaicínu dochádza k nadmernej stimulácii týchto receptorov, čo viedie k dlhodobej desenzibilizácii (zníženie citlivosti) nociceptorov a deplécií substancie P – čo je podstatou analgetického účinku.

- 辣椒 s obsahom kapsaicínu/53 mg kapsaicinoidov v 100 g krému
- 辣椒 rastlinný liek na zmiernenie bolesti svalov – napr. akútnej bolesťi svalov v krízovej oblasti chrbta
- 辣椒 aplikuje sa v tenkej vrstve na postihnuté miesto
- 辣椒 2- až 4-krát denne, do dosiahnutia úľavy od bolesti, v prípade potreby až 3 týždne
- 辣椒 veľmi mierny pocit pálenia strieda analgézia
- 辣椒 zvyšuje prekrvenie v mieste aplikácie
- 辣椒 obohatený o rozmarínovú silicu – krém s príjemnou vôňou

辣椒 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

- účinok tepla sa môže zintenzívniť aj fyzickou aktivitou (potenie) alebo teplom (napr. teplá voda)
- krém sa nemá používať v rovnakom čase (interval 12 hodín) na tom istom mieste aplikácie ako iné lieky na lokálne použitie, napr. gély na úľavu od bolesti
- po kontakte s krémom treba ruky umyť mydlom a vodou
- krém sa nesmie aplikovať na poškodenú kožu, rany a ekzém



Skrátená informácia o lieku Capsagamma® 53 mg/100 g krém

Zloženie: 100 g krému obsahuje 662,70 – 1 829,19 mg standardizovaného polotuhého extraktu z plodov papriky (Capsicum) (4 – 7 : 1). Extraktívne činidlo: etanol 80 % (V/V) zodpovedá 53 mg kapsaicinoidov, počítaných ako kapsaicín. **Indikácie:** Rastlinný liek na zmiernenie bolesti svalov, ako je bolest v krízovej oblasti chrbta. **Dávkovanie a spôsob podávania:** Dospelí a starší pacienti: Pokiaľ lekár nepredpishe inak, dospelí a starší pacienti majú naniesť tenkú vrstvu krému na postihnuté miesto 2- až 4-krát denne. Liek sa má používať až do dosiahnutia úľavy od bolesti, ak je to potrebné, až 3 týždne. Po 3 týždňoch používania je potrebné prerušiť aplikáciu krému najmenej 2 týždne. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na prípravky s obsahom extraktu z plodov papriky (Capsicum) alebo na ktorúkolvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Okrem toho sa krém nesmie aplikovať na poškodenú kožu, rany a ekzém. **Nežiaducí účinky:** Liečivo spôsobuje zvýšenie prekrvenia, ktoré je sprevádzané scervenáním kože a pocitom tepla. Táto reakcia je bežným farmakologickým účinkom rastlinného lieku. S neznámou frekvenciou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov) sa môže vyskytnúť precitlivenosť kože a alergické reakcie (napr. žihľavka, pluzgieriky alebo pluzgiere v mieste aplikácie). V takýchto prípadoch sa liečba musí okamžite ukončiť. V individuálnych prípadoch, ak vnímanie pálenia alebo bodania alebo svrbenia je vnímané ako príliš intenzívne, liečba sa má prerušiť. **Fertilita, gravidita a laktácia:** *Gravidita:* Nie sú k dispozícii údaje o používaní lieku v graviditácii. Štúdie na zvieratách preukázali reprodukčnú toxicitu po vysokých subkutálnych dávkach kapsaicínu. *Dojčenie:* Kapsaicín prechádza placentou a môže preniknúť do materského mlieka. I keď prenatálne a neonatálne účinky kapsaicínu boli pozorované pri dávkach prevyšujúcich maximálnu klinickú dávku, krém sa môže používať počas gravidity a dojčenia len po dôkladnom posúdení pomery prínosu a rizík. **Fertilita:** Nie sú dostupné údaje o fertiliti. **Ovplyvnenie schopnosti viest vozidlá a obsluhuvať stroje:** Liek nemá vplyv na schopnosť viest vozidlá a obsluhu strojov. **Velkosť balenia:** 40 g krému. **Registráčne číslo:** 29/0057/17-S. **Dátum poslednej revízie textu:** Január 2022. **Spôsob výdaja:** Volnopredajný liek.

Pred predpísaním, odporúčaním lieku si prečítajte, prosím, Súhrn charakteristických vlastností lieku, ktorý získate na www.sukl.sk alebo na adrese: